

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی توینین انسانی در غده سیب زمینی ترازیخته

فاطمه قربانی پارسا*

افقی حمیده**

چکیده

گیاهان به دلیل داشتن مسیر اصلاحات پس از ترجمه مشابه سلول های جانوری، سیستمی ارزان جهت تولید پروتئین های نوترکیب در مقیاس بالا را فراهم نموده اند. هدف این تحقیق بررسی بیان اختصاصی هورمون داروئی کلسی توینین انسانی (hCT) که در درمان بیماری های استخوانی نقش دارد در غده گیاه سیب زمینی (*Solanum tuberosum*) به عنوان میزبان بود. ژن سنتتیک کلسی توینین با توالی بهینه سازی شده بر اساس رمز های ترجیحی میزبان تحت کنترل پرومومتر ژن *Patatin* Class I با قابلیت ابراز اختصاصی در غده سیب زمینی و خاتمه دهنده NOS قرار گرفت و پس از کلون سازی در ناقل دوتایی از طریق آگروباکتریوم به غده گیاه سیب زمینی منتقل گردید. پس از ترازیختن و تکثیر، نسل اول گیاهان ترازیخته از نظر وجود ژن فوق توسط PCR و نیز میزان بیان پروتئین نوترکیب هدف بوسیله ELISA مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین بیان حاصل از واریته کاردا، با بیانی معادل ۱/ 5ng بود.

واژه های کلیدی: زراعت مولکولی، کلسی توینین انسانی، پرومومتر *Patatin*. سیب زمینی

*سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده بیوتکنولوژی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

**دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات *O foghi@irost.ir*

۹۱ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱ ، بهار

. (Solanum tuberosum) ترا ریخته

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده... ۲۵.....

مقدمه

امروزه سیستم‌های مختلف بر مبنای کشت سلولی و یا استفاده از موجودات تاریخته جهت تولید پروتئین‌های نوترکیب ارزشمند ابداع شده است. از جمله باکتری‌ها، قارچ‌ها، سلول‌های حیوانی و گیاهی و همچنین استفاده از حیوانات کامل، گیاهان و حشرات که هر یک از این سیستم‌های تولید از مزايا و محدودیت‌های خاص خود برخوردارند. در باکتری‌ها که رایج‌ترین سیستم تولید پروتئین نوترکیب هستند باقیستی به عدم تغییرات پس از ترجمه و خطر آلدگی با اندوتوكسین توجه کرد (۱). از سوی دیگر در سلول‌های جانوری یا حیوانات تاریخته نیز محدودیت‌هایی چون دشواری مراحل کشت با احتمال آلدگی زیاد و نیازمندی به مواد و تجهیزات گران‌بها وجود دارد و با مسائل اخلاقی و قانونی مواجه می‌باشند. همچنین احتمال آلدگی با توالی‌های سرطان‌زا نیز وجود دارد (۱۰).

پیشرفت‌های بیوتکنولوژی، گیاهان را قادر ساخته که به عنوان بیوراکتور جهت تولید پروتئین‌ها، چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها بکار گرفته شوند و مبحث جدیدی تحت عنوان زراعت مولکولی (Molecular Farming) مطرح شده است (۱۰). گیاهان به سادگی و با روش‌های طبیعی تاریخته می‌شوند و مسیر ساخت پروتئین و تغییرات پس از ترجمه در آن‌ها مشابه سلول‌های جانوری است، محدودیتی در اندازه ژن دخولی نداشته و راهکارهای متنوعی مثل استفاده از پیتیدهای نشانه و پرموتراهای مختص ارگان یا ارگانل برای تجمع پروتئین‌های نوترکیب در آن‌ها وجود دارد (۶ و ۱۷).

روش‌های متنوعی برای ادغام ژن‌های خارجی در قسمت‌های مختلف گیاه وجود دارد. این ژن‌های خارجی از منابع مختلف باکتریایی، قارچ‌ها، حیوانات و سایر گیاهان هستند روش رایج برای انتقال ژن به سلول‌های گیاهی، انتقال تو سط Agrobacterium tumefaciens است که سبب کاهش موانع موجود در مهندسی ژنتیک گیاهی شده است. تاکنون ژن‌های مختلفی از جمله ژن هورمون رشد، انسولین و پروتئین‌های ویروسی و باکتریایی با این شیوه به گیاهان منتقل شده‌اند (۴).

هورمون کلسی تونین انسانی نیز پیتیدی ۳۲ اسید‌آmine‌ای و غیر گلیکوزیله است که نقش اساسی

۶ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۹۱

در متابولیسم کلسیم - فسفر داشته و به عنوان هورمون درگیر در ترمیم استخوان شناخته می‌شود. مشتقان کلسی توینی برای درمان پوکی استخوان، بیماری پاژه وغیره کاربرد دارویی دارد (۱۷). تاکنون تلاش‌های گسترده‌ای برای تولید این هورمون دارویی اعم از نوع انسانی یا حیوانی آن به صورت نوترکیب در میزان‌های مختلف باکتریایی، حشرات و گیاه انجام شده است (۹ و ۳).

در بین گیاهان مورد توجه در عرصه بیوتکنولوژی سیب زمینی به دلیل داشتن مزایایی همچون قابلیت گیاه به عنوان یکی از میزان‌های باکتری آگروباکتریوم جهت انتقال ژن و بازده مطلوب آن، سهولت تکثیر و باززایی (Regeneration) از کشت بافت، قابلیت تکثیر غیرجنسی، دوره زمانی کوتاه تا تولید محصول، تولید بیوماس زیاد، وجود پروموترهای مختلف جهت بیان ژن در قسمت‌های مختلف گیاه، قابلیت نگه داری و انبارکردن این محصول و استفاده از غده‌های خام به صورت مستقیم و خوارکی در صورت تولید واکسن اهمیت دارد (۱۳).

در این پژوهش تلاش شد تا با بهینه سازی کدون‌های ژن دخولی میزان بیان در میزان گیاهی افزایش یابد و بعلاوه از پرومتر مختص اندام استفاده شد که امکان تجمع پروتئین نوترکیب تولیدی در اندامی خاص را فراهم می‌کند و به این ترتیب استخراج پروتئین تسهیل و مزیت‌هایی نیز در رابطه با این زیستی و جلوگیری از بیان همه جایی و تداخل احتمالی با رشد نرمال گیاه فراهم گردد (۱۰ و ۱۹).


مواد و روش‌ها

گیاه مورد پژوهش: سیب زمینی (*Solanum tuberosum*) رقم‌های کاردا و مارفونا بود. این گیاه تترابلورید و تعداد هاپلولید کروموزوم‌های آن ۱۲ می‌باشد و به صورت جنسی و غیر جنسی تکثیر می‌یابد.


ناقلين مورد استفاده: برای بیان هورمون کلسی توینی انسانی (hCT) در گیاه سیب زمینی از ناقلين pPCR-Script Amp (تهیه شده از Intelechon) حاوی توالی مربوط به ژن hCT بهینه سازی شده برای بیان در سیب زمینی (شکل ۱)، pP1 حاوی پرومتر ژن Class I Patatin مختص ابراز در غده سیب زمینی و خاتمه دهنده NOS (شکل ۲) و ناقل دوتایی Bin19 (شکل ۳) استفاده شد (pPI-CAT) و Bin19 تهیه شده از Institute of

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده..... ۲۷

.(molecular Genetics, Moscow




شکل ۱- تصویر شماتیک پلاسمید PCR-Script Amp



شکل ۲- تصویر شماتیک پلاسمید pPI-CAT

۲۸ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۹۱



شکل ۳- تصویر شماتیک پلاسمید Bin 19

سویه های باکتریایی: برای انجام مراحل کلونینگ و نیز انتقال ژن به گیاه از دو سویه باکتریایی *Agrobacterium tumefaciens LBA4404* و *E.coli DH5α* استفاده شد.

مراحل همسانه سازی (کلونینگ): پلاسمید PCR-Script Amp حاوی قطعه hCT استر شده توسط شرکت Intelechon، مورد هضم آنزیم *BamHI* قرار گرفت. قطعه ژن hCT با اندازه تقریبی ۱۱۴ نوکلئوتید از روی ژل آگاروز با استفاده از کیت خالص گردید که توالی این ژن به شرح زیر بود.

5'GGATCCATGTGTTGGAAATCTGAGTACTGCATGCTTGGC
ACATACCCCAAGATTCAACAAGTTCATACTTTCCACAGA
CAGCTATTGGTGGAGCACCTAACGGATCC 3'

از سوی دیگر پلاسمید pP1 در جایگاه *BamHI* بریده شده و به صورت خطی درآمد و از روی ژل بوسیله کیت اختصاصی برای استخراج DNA (تهیه شده از شرکت Bioneer) خالص سازی شد. سپس قطعه hCT در جایگاه *BamHI* بین پرموتر Class I Patatin و توالی خاتمه دهنده *Scal/XbaI* پلاسمید pP1 وارد گردید. برای تعیین وجود و جهت قطعه در ناقل از هضم آنزیمی استفاده شد (۴۵۵ bp = antisense، ۳۸۱ bp = sense). همچنین با استفاده از جفت پرایمرهای اختصاصی، عمل PCR با پرایمرهای طراحی شده پیشرو (forward) و پیرو (reverse) (کلسی توین و نیز پیرو nos terminator) (ساخته شده توسط سیناژن) انجام شد.

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی توئین انسانی در غده...

توالی پرایمرها به شرح زیر است:

CalF: 5'-CCGGATCCATGTGCGGTAATCTGAGTACTTGC-3'

CalR: 5'-GGGGATCCTAAGGTGCTCCAACCC-3'

Nos terR: 5'-CGCGCGATAATTATCCTAGT-3'

PCR با یک مرحله واسرتستگی ۵ دقیقه ای در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد آغاز و در ۳۰ دقیقه ای در دمای ۹۴ درجه سانتی گراد، دمای اتصال ۶۵ درجه سانتی گراد و دمای بسط ۷۲ درجه سانتی گراد صورت گرفت و در پایان نیز یک مرحله بسط در دمای ۷۲ درجه سانتی گراد به مدت ۵ دقیقه انجام شد. پس از اطمینان از حضور قطعه و صحیح بودن جهت آن برش با آنزیم *HindIII* انجام گرفت (شکل ۹) و قطعه ۲۶۵۰ نوکلئوتیدی حاصل از هضم آنزیمی شامل کاست حاوی پروموتر، توالی کد کننده hCT و توالی پلی آدنیلاسیون در جایگاه *HindIII* ناقل دوتائی *Bin19* برای انتقال به گیاه کلون شد. کلňی های به دست آمده از نظر وجود قطعه فوق مورد بررسی مجدد بوسیله هضم با آنزیم *BamHI* و نیز با PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی پیشرو (forward) و پیرو (reverse) nos(reverse) با سیکل دمایی همانند مرحله قبل قرار گرفت.


کشت بافت سیب زمینی: کشت بافت سیب زمینی با روش کشت جوانه های حاصل از دیسک غده (shoot tip culture) انجام شد.

برای انجام فرایند ترانسفورماتیون در این گیاه دست یابی به رشد کافی و در ادامه غذه زانی گیاه ضروری بود که به این منظور محیط کشت رشد و تکثیر MS (MURASHIGE & SKOG Medium) جامد (میزان سوکروز ۳٪) با دوره نوری ۱۶ ساعت روشنایی و ۸ ساعت تاریکی با ترتیب دمایی ۲۰ و ۱۸ درجه سانتی گراد استفاده شد که پس از به دست آوردن ساقه های ۷ تا ۸ گرهی برای القای غده به آن ها محیط کشت MS غده زایی (میزان سوکروز ۸٪) افزوده شد. پس از افزوده شدن محیط غده زایی، گیاهان به مدت ۱۰ روز در شرایط تاریکی مطلق و دمای ۴ درجه سانتیگراد و پس از آن با حفظ شرایط تاریکی مطلق به دمای ۱۸ درجه سانتیگراد منتقل شدند.

تاریختی گیاهان و باززایی آن ها: عمل تاریختی در گیاه سیب زمینی شامل دو مرحله آماده سازی آگروباکتریوم تومه فاسینس حامل پلاسمید *Bin19* و آماده نمودن ریز غده ها

۹۱ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۱

می‌شود. به این ترتیب که ریزغله‌های تولید شده در شرایط استریل با عمر کمتر از شش ماه به صورت دیسک‌هایی با قطر ۱-۲ mm بریده شد و این دیسک‌ها روی سطح محیط MLS (MURASHIGE & LINSMAIER & SKOG Medium) جامد بدون آنتی‌بیوتیک قرار گرفت و با سوزن استریل سطح آن‌ها زخمی گردید. آگروباکتریوم تومه فاسینس (Bin19) و کاست بیانی (کشت شده به مدت ۴۸ ساعت در محیط LB و دمای ۲۸ درجه سانتیگراد در انکوباتور شیکردار) که OD آن معادل ۰/۱ در طول موج ۶۰۰ nm بود رسوب داده شد و سپس در محیط MLS مایع وارد شد و حدود ۲۰ میکرولیتر از آن روی دیسک‌های آماده سازی شده ریخته شد (شکل ۴).



شکل ۴- هاله رشد آگروباکتریوم در کناره غده‌ها پس از گذشت ۲۴ ساعت

پتری‌های مذکور به مدت ۲۴ ساعت در تاریکی و دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد قرار گرفتند. پس از شستشو جهت حذف آگروباکتریوم و ایجاد شرایط انتخابی دیسک‌ها به محیط MLS محتوی آنتی‌بیوتیک (سفوتاکسیم ۵۰۰ mg/L و کاناامایسین ۱۰۰ mg/L) انتقال یافتند و باز هم در تاریکی و دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد برای جوانه زایی قرار گرفتند. جوانه‌های ثانویه (secondary shoot) به طول ۱/۵-۲ cm حاصل از دیسک‌ها برای به دست آوردن گیاه کامل جدا و در محیط مشابه (cefo-kn-Mls) در شرایط نوری ۱۶ ساعت روشنایی، ۸ ساعت تاریکی با ترتیب دمایی ۲۰ و ۱۸ درجه سانتی‌گراد قرار گرفت. زمانی که طول گیاهان به حدود ۴/۵ cm رسید به محیط بدون سفوتاکسیم منتقل شدند پس از رشد گیاه ترا ریخته به

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده... ۳۱.....

حد تقریباً ۵ گرهی روی آن محیط MS غده زائی ریخته شد. استخراج DNA و پروتئین از گیاه تراریخت: برای تایید وجود سازه بیانی در گیاهان تراریخته به دست آمده از محیط انتخابی، DNA از اندام های سیز با روش CTAB (۱۱) استخراج و توسط PCR با استفاده از پرایمرهای اختصاصی در ۳۰ سیکل حرارتی با دمای واسرشتنگی ۹۴ درجه سانتی گراد، دمای اتصال ۶۵ درجه سانتی گراد و دمای بسط ۷۲ درجه سانتی گراد مورد بررسی قرار گرفته شد. برای بررسی میزان پروتئین بیان یافته، غده از گیاهان تراریخته جدا و مجموع پروتئین های محلول (TSP) آن با استفاده از بافر استخراج پروتئین (شامل ۲% 2-Mercaptoethanol, Triton X-100, MgCl₂ 5mM, EDTA 1mM, NaCl 10mM به دست آمد و سپس به صورت اختصاصی میزان کلسی تونین بیان یافته توسط روش ELISA با استفاده از کیت اختصاصی (BioSource CT-US) مورد بررسی قرار گرفته شد.

نتایج و بحث

کشت سیب زمینی: از گیاه اولیه غده به دست آمد (شکل ۵) و از جوانه های حاصل از غده های آلوده شده با آگروباکتریوم گیاهان ترانس ژنیک حاصل شد (شکل ۶) که در محیط MLS دارای آنتی بیوتیک کاتامایسین ریشه زایی کرده و به این ترتیب شناسایی شدند (شکل ۷) و از آن ها مجدد غده به دست آمد.

کلونینگ: جداسازی ژن hCT از ناقل (شکل ۸) و خطی کردن پلاسمید pPI انجام شد (شکل ۹).




شکل ۵- کشت بافت سیب زمینی در محیط MS

۹۱ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۱۳۹۳




شکل ۶- جوانه زایی غله های آلوده شده با آگروباکتریوم روی محیط MLS




شکل ۷- انتخاب گیاه ترازیخته در محیط کشت انتخابی

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده.....سیم




شکل ۸- خارج کردن ژن کلسی تونین از پلاسمید PCR – Scrip Amp .BamHI توسط DNA سایز مارکر ۱۰۰bps است و ردیف دوم پلاسمید PCR – Scrip Amp .BamHI بریده شده توسط




شکل ۹- جداسازی قطعه CAT از پلاسمید Patatin . ردیف اول پلاسمید Patatin . ردیف دوم DNA سایز مارکر و ردیف سوم پلاسمید Patatin که قطعه CAT از آن جدا شده است.

کلون کردن قطعه ژن hCT در ناقل pPI با موفقیت انجام شد و سازه pP1/hCT در جهت sense به دست آمد. (شکل ۱۰)

۹۱ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۱۴۰۰



شکل ۱۰- تعیین جهت ژن CT توسط PCR. ردیف اول DNA سایز مارکر ۱۰۰ bps، ردیف دوم باند ۱۰۰ نوکلتوتیدی حاصل از دیاد ژن کلسی توین و ردیف سوم باند ۷۰۰ نوکلتوتیدی که حاصل از دیاد کلسی توین و Nos ترمیتاتور است.




شکل ۱۱- تعیین جهت ژن کلسی توین با نقشه ژنتیکی. ردیف اول DNA سایز مارکر ۱۰۰ bps، ردیف دوم پلاسمید pPI-Cal بریده شده با Scal و XbaI

برش با آنزیم *HindIII* انجام شد و قطعه ۲۶۵۰ نوکلتوتیدی حاصل از هضم آنزیمی شامل


انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده..... ۳۵

کاست حاوی پرموتر، توالی کد کننده hCT و توالی پلی آدنیلاسیون جدا شد. (شکل ۱۲)



شکل ۱۲- بریده شدن پلاسمید Patatin با آنزیم *Hind*III. ردیف اول باند های حاصل از هضم پلاسمید Patatin با آنزیم *Hind*III است و ردیف دوم DNA سایز مارکر .۱۰۰bps


با استفاده از کاست جدا شده، سازه Bin19/pP1/hCT تهیه شد که در تصویری شماتیک ساختار این سازه نشان داده شده است (شکل ۱۳) و وجود ژن در پلاسمید *Bin 19* با آنزیم *Bam*HI مورد تایید قرار گرفت (شکل ۱۴).



شکل ۱۳- تصویر شماتیک ساختار سازه CT

۹۱ شماره ۱ ، بهار ۱۳۹۱ ، سال اول، فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی

۱ ۲



شکل ۱۴- تایید وجود ژن CT در پلاسمید Bin ۱۹ . ردیف اول DNA سایز مارکر ۱۰۰ bps و ردیف دوم باند نوکلتوتیدی حاصل از برش با BamHI پس از استخراج از *E.coli*.

در آزمایش‌های PCR و ELISA انجام گرفته بر روی غده‌ها و برگ‌های گیاهان تراریخته وجود ژن کلسی توینین انسانی در غده و عدم وجود آن در برگ تایید و میزان بیان هورمون کلسی توینین انسانی در آن به صورت اختصاصی مشخص شد. بیشترین بیان از واریته کارداں به دست آمد و برابر 1.5 ng بود در حالیکه این میزان در واریته مارفونا برابر 0.5 ng بود. با توجه به اهمیت هورمون کلسی توینین و نقش آن در تنظیم سطح کلسیم پلاسمما، تاکنون کلسی توینین برای کاربرد درمانی از غدد اولتیمو برانشیال ماهی سالمون (Salmon Calcitonin) استخراج و یا کلسی توینین انسانی (Human Calcitonin) به وسیله سنتزهای شیمیایی تولید می‌شده اما هزینه‌های بالای چنین تولیدی و نیز توجه به این نکته که فعالیت بیولوژیکی محصول سینтетیک بیش از ۱۰ بار در مقایسه با نوع طبیعی کم تر می‌باشد (۸) و افزایش نیازمندی به hCT سبب آغاز فعالیت‌های تحقیقاتی برای توسعه فرایندهای بیوتکنولوژی جهت تولید کلسی توینین انسانی نوترکیب شده است (۱۲).

تلاش‌های اولیه برای بیان hCT به صورت نوترکیب در *E.coli* رضایت بخش نبود و محصول اندکی از آن حاصل می‌شد که احتمال داده شد کم بودن میزان بیان پروتئین مربوط به تجزیه پروتئین توسط سیستم پروتئاز درون سلولی باشد که برای رفع این مشکل دوشیوه به

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده... ۳۷.....

کار رفت. راهکار اول تولید hCT به صورت فیوژن با ژن هایی بود که بیان بالا داشتند اما زمانی که ارگام با چنین پروتئین هایی انجام شد جداسازی پیشید هدف از پروتئین های همراه شده نیازمند فرایندهای اختصاصی و پرهزینه بود (۱۲ و ۳). روش دیگر الیگومریزه کردن ژن کلسی تونین انسانی که با این هدف تولید hCT در پروکاریوت ها مثل *E.coli* (۱۸) و *Staphylococcus carnosus* انجام شد اما این پروکاریوت ها تنها می توانند پیش ساز کلسی تونین (precursor hCT) را تولید کنند و توانایی تولید کلسی تونین فعال (دارای آمیداسیون در انتهای C) را ندارند (۱۲ و ۳).

همچنین غیر از کلسی تونین انسانی، کلسی تونین تولید شده از منابع دیگر مثل سالمون، مارماهی و خوک برای درمان انواع بیماری های متابولیسمی استخوان به کار رفته و برای تولید آن ها با روش های نوترکیبی نیز تلاش های گسترده ای شکل گرفته از جمله گزارش تولید sCT در شیر خرگوش (۷) و نیز تولید آن در *Streptomyces avermitilis* اما باستی توجه داشت که همه کلسی تونین ها به جز نوع انسانی بالقوه در انسان آنتی ژن هستند و استفاده دراز مدت از sCT کاهش فعالیت آن را به دنبال دارد (۱۴ و ۲).

تاکنون بیان پروتئین های مختلفی در گیاهان با موفقیت به انجام رسیده است و گیاهان ترانس ژنیک به عنوان بیوراکتورهای مناسب برای تولید پروتئین نوترکیب شناخته می شوند (۱۶).

سیب زمینی یکی از گیاهان زراعی است که در پروژه های زراعت مولکولی مورد توجه قرار گرفته و پروتئین های بسیاری در آن بیان شده و به عنوان بزرگترین سیستم گیاهی تولید واکسن نوترکیب مطرح گشته است. از جمله پروتئین هایی که در آن بیان شده پروتئین کپسیدی روتاوروس (VP6) برای واکسیناسیون علیه گاستروانتریت حاد ویروسی (۱۵) و بیان آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B (HBsAg) به عنوان واکسن نوترکیب علیه هپاتیت B بوده است (۱۰).

از مزایایی به کارگیری این گیاه در نقش کارخانه تولید پروتئین های نوترکیب قابلیت نگهداری و انبار داری غده برای مدت طولانی، استفاده از غده های خام آن به صورت مستقیم و خوراکی در صورت تولید واکسن، عملکرد بالای محصول در مزرعه و در نتیجه تولید بیوماس بالا و تکثیر غیر جنسی و نبود تفرق ژنتیکی در نسل های بعدی آن است. (۱۴ و ۱)

در ادامه تلاش ها برای افزایش بیان کلسی تونین انسانی، انتقال آن به میزبان گیاهی با توجه

۳۸ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱، بهار ۹۱

به مزیت هایی که ذکر شد مورد توجه قرار گرفت. در تحقیقات قبلی که در آن تولید کلسمی توینین انسانی در گیاه سیب زمینی مورد توجه قرار گرفته بود ژن کلسمی توینین به دو صورت مونومر و تترامر تحت کنترل پروموتر CaMV 35S قرار گرفت و از دو تقویت کننده Tobacco TEV (TMV) Mosaic Virus (TVE) برای افزایش میزان بیان استفاده شد که در نهایت با توجه به اینکه pCaMV پروموتری دائمی و غیر اختصاصی است و در همه بافت های گیاه بیان می شود کلسمی توینین تولید شده تقریباً ۲۰۰ پیکوگرم از (TSP) Total Soluble Protein غده گیاه را تشکیل می داد (۸).

با توجه به تحقیقات دیگر از جمله تولید آلبومین سرمی انسان (HSA) در سیب زمینی که تولید آن تحت کنترل هر دو پروموتور CaMV 35S و Patatin بررسی و افزایش بیان از TSP ۰.۰۲% به ۰.۲٪ هنگام استفاده از پروموتور Patatin گزارش شده بود (۴). در این پژوهش که ادامه تحقیقات قبلی جهت تولید کلسمی توینین انسانی در سیب زمینی است تلاش شد با استفاده از پروموتور اختصاصی غده و نیز بهینه سازی کدون ها برای بیان در سیب زمینی افزایش بیان حاصل شود.


نتیجه گیری

در این تحقیق که اولین گزارش از تولید اختصاصی هورمون کلسمی توینین انسانی در غده سیب زمینی بود با استفاده از پلاسمید Bin19 و *Agrobacterium* سویه LBA4404 ژن LBA4404 کلسمی توینین انسانی به کروموزوم سیب زمینی منتقل شد. در این سیستم بیان ژن تحت کنترل پروموتور Class I Patatin که اختصاصی غده سیب زمینی است قرار گرفت تا از بیان همه جایی پروتئین هدف جلوگیری و تغليظ آن امکان پذیر شود. کدون های این ژن را براساس رمزهای ترجیحی (codon bios) برای بیان در سیب زمینی طراحی نموده و در انتهای آن سیگنال پلی آدنیلاسیون NOS قرار گرفت. در نهایت برای بررسی میزان کلسمی توینین بیان شده از روش ELISA استفاده شد و نتایج حاصل بیانی معادل $1472/8585 \text{ pg/g}$ پروتئین کلسمی توینین در یک گرم غده تازه واریته کارداش و $568/3544 \text{ pg/g}$ پروتئین کلسمی توینین در یک گرم غده تازه واریته مارفونا را نشان داد. این میزان بیان افزایش قابل توجهی نسبت به

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی توینین انسانی در غده..... ۳۹

زمانی که ژن کلسی توینین انسانی تحت کنترل پروموتر CaMV 35S با بیان غیر اختصاصی قرار گرفته بود نشان می داد که در نمودار ۱ به آن پرداخته شده است.

نمودار ۱- مقایسه میزان بیان هورمون کلسی توینین انسانی در غده سیب زمینی (واریته کاردال) با دو پروموتور



۹۱ فصلنامه بیوتکنولوژی و میکروبیولوژی کاربردی/سال اول، شماره ۱ ، بهار ۱۴۰۵

تشکر و قدردانی

از سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و EMRO-WHO برای حمایت مالی و فراهم نمودن امکان این تحقیق نهایت سپاس و قدردانی را داریم.

منابع

- 1.Bajaj Y.P.S. (1987). "Biotechnology in agriculture and forestry 3 potato". Springer-Verlag
- 2.Chakraborty C, Nandi ss, Sarkar B, Sinha S ,(2005) "Overexpression and purification of recombinant eel calcitonin and its phylogenetic analysis". Protein Peptid Letter. 2005 Apr;12(3):263-9
- 3.Dilsen S,Tippe D, Sandgathe A.,Halfar M. (2000) "Fed-batch production of recombinant human calcitonin precursor fusion protein using Staphylococcus carnosus as an expression –secression system". Appl Microbiol Biotechnol. 54(3):361-9
- 4.Farran Inma, Jos'e J. S'anchez-Serrano, Juan F. Medina, Jes'sus Prieto, Angel M. Mingo-Castell. (2002) "Targeted expression of human serum albumin to potato tubers". Transgenic Research 11: 337–346, 2002.
- 5.Fischer R, Drossard J, Commandeur U, Schillberg S, Emans N. (1999) "Towards molecular farming in the future moving from diagnostic protein and antibody production in microbes to plants". Biotechnology Applied Biochemistry. 30 (Pt 2):101-8.
- 6.K-C.Ma1 Julian, Eugenia Barros, Ralph Bock,Paul Christou, Philip J. Dale, Philip J. Dix,Rainer Fischer, Judith Irwin, Richard Mahoney, Mario Pezzotti, Stefan Schillberg, Penny Sparrow5, Eva Stoger, Richard M. -Twyman. (2005) "Molecularfarming for new drugs and vaccines Current perspectives on the production of pharmaceuticals in transgenic plants". EMBO reports. 6(7) 2000-2005.
- 7.McKee Colin, Gibson Allan, Darlimple Mike, Emslie Liz. (1998) "Production of biologically active salmon calcitonin in the milk of transgenic rabbits". Nature Biotechnology. 16,1234-1239
- 8.Ofoghi H, Moazami N., Domonsky N.N., Ivanov I. (2000),

انتقال هدایت شده و بیان اختصاصی هورمون کلسی تونین انسانی در غده ۴۱

“Cloning and expression of human calcitonin gene in transgenic potato plant”. Biotechnology Letters. 22,611-615

9.Twyman.Richard M., Stoger Eva, Schillberg Stefan, Christou Paul Fischer Rainer. (2003). “Molecular farming in plants: host systems and expression technology”. TRENDS in Biotechnology. 21(12), 143-176.

10.Liz J Richter, Thanavala Yasmin, J. Arntze Charles, Mason Hugh S. (2000) “Production of hepatitis B surface antigen in transgenic plants for oral immunization”. Nature Biotechnology. 18: 123-128

11.Sambrook.J., Fritsch,E.F., Maniatis, T., (1989). “Molecular Cloning a Laboratori Manual” 2nd. Ed. , cold spring Harbor Laboratory Press.

12.Sandgathe A., D.Tippe , S. Dilsen , J.Meens , M.Halfar. (2003) “Production of a human calcitonin precursor with *Staphylococcus carnosus*:secretory expression and single-step recovery by expanded bed adsorption”. Process Biochemistry.38 ,1351-63

13.Stanton B. Gelvin. (2003) “Agrobacterium-Mediated Plant Transformation: the Biology behind the “Gene-Jockeying” Tool”. Microbiology And Molecular Biology Reviews. 16–37

14.Yabuta M., Suzuki Y., Ohsuye K. (1995) “High expression of a recombinant human calcitonin precursor peptide in E.coli”. Appl Microbiology Biotechnology. 42:703-70

15.Yu,J.and Langridge,w. (2003) , Expression of Rotavirus capsid protein VP6 in transgenic potato and its oral immunogenicity in mice , Transgenic Res. 12,163-9

16.Yoshida Kazuya & Shinmyo Atsuhiko. (2000) “Transgene expression system in plants a current perspective” , JPlant-Bioscience & Bioengineering. 90(4) , 353-362

17.Zaidi M, Inzerillo A. M. , Moonga B. S. , Bevis P.J. , Huang C. (2002) Forty years of Calcitonin – “Where are we now? Atribute to the work of Iain Macintyre”, FRS. Bone. 30(5),655-663

18.Zourelidou M, de Torres-Zabala M, Smith C, Bevan MW. (2002) “Storekeeper defines a new class of plant-specific DNA-binding proteins and is a putative regulator of patatin expression”. Plant sournal. 30(4),489-97.